

**UNJT FARMASJ KLINIKAL DAN MAKLUMAT DRUG,
JABATAN FARMASJ, HOSPITAL USM**

FORTTRANS

(Macroglol 4000 64g, KCl 0.75g, saccharin Na 0.1g, Na bicarbonate 1.68g, NaCl 1.46g, anhydrous Na sulphate 5.7g)

Apa pesakit perlu tahu????



Indikasi

Untuk membersihkan usus sebagai persediaan sebelum prosedur kolonoskopi dan sebelum pembedahan.

Cara Makan Fortrans



Sehari sebelum prosedur

PADA PUKUL 8 MALAM :

Larutkan 1 sachet Fortrans dalam 1 liter air masak, minum segelas demi segelas sehingga habis dalam masa 1 jam.

Pada hari prosedur kolonoskopi

PADA PUKUL 7 PAGI:

Larutkan 1 sachet Fortrans dalam 1 liter air masak, minum segelas demi segelas sehingga habis dalam masa 1 jam.

PADA PUKUL 8 PAGI:

Larutkan 1 sachet Fortrans dalam 1 liter air masak, minum segelas demi segelas sehingga habis dalam masa 1 jam.



Peringatan



Pemakanan sebelum pukul 7 malam sehari sebelum prosedur:

Makan roti putih kosong, bubur kosong atau bubur ikan sahaja.


Elakkan makan sayur, buah-buahan, daging merah, susu, bahan tenusu, roti "wholemeal", bijirin dan oat.

Pemakanan selepas pukul 7 malam sehari sebelum prosedur:

Makan minuman kosong seperti air glukos, air barli, sup kosong jernih, teh tanpa susu atau kopi tanpa susu sahaja.

Fortarns boleh disejukkan di dalam peti ais untuk rasa yang lebih baik

Kesan pembersihan usus akan bermula selepas 1 – 2jam pesakit minum forttrans



Sila minum banyak air selepas makan ubat ini bagi mengelakkan dehidrasi

Rujukan:

- 1) <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/fortrans>
- 2) <https://www.drugs.com/international/fortrans.html>
- 3) <http://dformulary.h.usm.my>