

## DEFERIPRONE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Menyingkirkan zat besi berlebihan daripada badan yang disebabkan oleh pemindahan darah yang kerap dalam kalangan individu yang mempunyai thalassaemia major (sejenis penyakit darah).

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini mengikat zat besi berlebihan di dalam badan dan menyingkirkannya keluar daripada badan

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama setiap hari



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Pernah mempunyai reaksi alahan/ alergik terhadap Deferiprone atau mana-mana bahan eksipien.
- ✚ Mengalami sejarah masalah neutropenia (sel darah putih yang sangat rendah) atau mengambil ubat yang akan menyebabkan masalah tersebut.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan seperti sakit di bahagian abdomen atau loya dan muntah
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Sakit di bahagian abdomen
  - Loya
  - Muntah
  - Urin berwarna kemerahan/ keperangan
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Sakit pada sendi yang berlarutan
  - Masalah saraf yang berlarutan

Rujukan:

- Risalah maklumat ubat: Deferiprone (Ferriprox ®)  
<https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.10908.pdf> Revised 05/2020  
(accessed on 15/9/2021)
- <https://reference.medscape.com/drug/ferriprox-deferiprone-100038#0>  
(accessed on 15/9/2021)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---