

CLOMIPHENE

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?



- Ubat ini merawat wanita yang kurang subur supaya dapat menghasilkan kehamilan.

B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan merangsang ovulasi (pembebasan telur daripada ovar) wanita supaya persenyawaan dapat berlaku dan seterusnya menghasilkan kehamilan.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?



A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor
- Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- Ubat ini perlu diambil pada waktu yang sama setiap hari seperti yang diarahkan

B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Hubungi doktor anda segera untuk arahan seterusnya.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal, pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

- Maklumkan kepada doktor jika anda;
- ✚ Mempunyai alahan/alergi kepada ubat ini.
 - ✚ Mengalami pendarahan faraj yang luar biasa
 - ✚ Mempunyai sista ovari, ketumbuhan pada kelenjar pituitari atau bahagian lain otak dan masalah kelenjar adrenal/tiroid..
 - ✚ Mempunyai atau pernah mempunyai penyakit hati.
 - ✚ Hamil atau memberi susu badan
 - ✚ Mengambil sebarang vitamin, produk herba atau ubat-uba
 - ✚ Merokok atau mengambil alkohol.



➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

- Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: kembung/sakit perut)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

E. KESAN SAMPING UBAT

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- ✚ Hot Flushes (kulit menjadi panas/kemerahan)
- ✚ Sakit/ketidakselesaan pada payudara
- ✚ Pening /sakit kepala
- ✚ Loya
- ✚ Muntah

- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- ✚ Tanda reaksi alergi seperti susah bernafas, bengkak pada muka/bibir mulut/lidah/tekak
- ✚ Tanda sindrom rangsangan melampau ovarи (OHSS) seperti kembung/ sakit perut, loya, muntah, diarea, sedikit/tiada air kencing, peningkatan berat badan yang cepat, sesak nafas atau sakit semasa bernafas.
- ✚ Sakit/bengkak pada pelvis
- ✚ Masalah penglihatan/mata terlalu sensitif pada cahaya
- ✚ Pendarahan faraj yang melampau

Rujukan:

- drugs.com
- rxlist.com
- webmd.com
- BNF 70
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
