

DANAZOL

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini digunakan untuk merawat endometriosis
- ✚ Mencegah simptom penyakit angioedema secara keturunan (HAE)



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan pengeluaran hormon daripada ovari yang menyebabkan simptom-simptom endometriosis
- ✚ Membantu meningkatkan paras protin tertentu dalam sistem imun badan



C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor
- ✚ Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama seperti yang diarahkan

B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal, pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai alahan/alergi kepada ubat ini.
- ✚ Mengalami pendarahan faraj yang tidak diketahui puncanya
- ✚ Mempunyai masalah jantung yang serius
- ✚ Mempunyai penyakit hati, buah pinggang, darah tinggi atau diabetes.
- ✚ Pernah mengalami strok, darah beku atau sejarah penyakit kanser yang berkaitan hormon.
- ✚ Mempunyai penyakit sawan atau migrain
- ✚ Hamil atau memberi susu badan
- ✚ Mengambil sebarang vitamin, produk herba atau ubat-uba



➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: pendarahan faraj yang luarbiasa)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan

AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - ✚ *Hot Flushes* (kulit menjadi panas/kemerahan)
 - ✚ Perubahan pada kitaran haid
 - ✚ Pendarahan faraj yang luar biasa
 - ✚ Rasa berdebar/perubahan emosi
 - ✚ Kekeringan/iritasi faraj atau perubahan pada payu dara

- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - ✚ Tanda reaksi alergi seperti susah bernafas, bengkak pada muka/bibir mulut/lidah/tekak
 - ✚ Sakit perut pada bahagian atas sebelah kanan
 - ✚ Hilang selera makan
 - ✚ Kahak, muntah, najis atau air kencing berdarah
 - ✚ Sakit tekak atau suara menjadi garau
 - ✚ Keguguran rambut/jerawat

Rujukan:

- drugs.com
- rxlist.com
- webmd.com
- BNF 70
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
