

AZITHROMYCIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Mengubati pelbagai jenis jangkitan bakteria.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit kuning, penyakit hati, masalah buah pinggang, myasthenia gravis atau masalah jantung.
- ✚ Mempunyai alergi dengan ubat Clarithromycin atau Erythromycin.
- ✚ Mengambil sebarang ubat (cth: Digoxin, Warfarin), vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan
- ✚ Elakkan terdedah kepada cahaya matahari tanpa memakai pelindung matahari SF30 kerana boleh menyebabkan kulit menjadi gelap.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: Jantung berdegup laju)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Cirit-birit
 - Loya atau muntah
 - Sakit perut
 - Sakit kepala

- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Reaksi alergi seperti gatal-gatal, sukar bernafas, bengkak muka atau tekak, demam, kepanasan seperti terbakar pada kulit atau mata.
 - Rasa letih yang melampau.
 - Kesukaran untuk bernafas.
 - Muntah, sakit perut dan kejang otot
 - Cirit-birit yang teruk

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/metformin.html> (accessed on 23/10/21)
- <https://www.rxlist.com/zithromax-drug.htm#description> (3/10/21)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
