

CLOTRIMAZOLE PESSARY

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Merawat jangkitan kulat/ fungus



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak pada dinding sel kulat/ fungus dengan merencat sintesis protein bagi menghentikan pertumbuhan kulat/ fungus.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA GUNA

- Gunakan pesari mengikut arahan dan jangkamasa yang ditetapkan sahaja.
- Masukkannya ke dalam faraj (alat kelamin) pada waktu malam, sebelum tidur
- Basuh tangan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih
- Taggalkan pembalut pesari.
- Letakkan pesari pada hujung alat pemakai yang dibekalkan.
- Baring dengan kedua lutut dibengkokkan dan masukkan alat pemakai ke dalam vagina secara perlahan sejauh yang selesa dan tekan tombul/ plunger untuk tolak pesari ke dalam.
- Keluarkan alat pemakai dari vagina.
- Untuk elakkan pesari daripada terkeluar,kekalkan dalam keadaan baring selama 15 minit.
- Basuh tangan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih.
- Cuci alat pemakai jika pelu digunakan semula dengan sabun dan air suam.



C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

B. JIKA TERLUPA

- ➊ Gunakan pada malam yang berikutnya.
- ➋ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- ➊ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bawah 25 °C, jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ➋ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Jika anda alah kepada ubat antikulat ini atau ejen antikulat azole lain.
- ✚ Jika anda merancang kehamilan kerana ubat ini boleh melemahkan produk getah seperti kondom, diafragma dan topi serviks.
- ✚ Sekiranya anda hamil dan merancang untuk hamil.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Jangan guna tampon, douches, spermisida atau produk faraj lain.

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: gatal-gatal/ kesakitan/ kekejangan perut)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Rasa terbakar di bahagian faraj
- Gatal-gatal
- Kekejangan perut
- Sakit kepala

⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya kesan samping di atas berlarutan atau bertambah teruk.

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/clotrimazole-vaginal.html>
- Risalah maklumat ubat: Candid® V-1
- New Guide to Medicines and Drugs (British Medical Association)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
