

ERYTHROMYCIN TABLET/SIRUP

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini digunakan untuk mengubati jangkitan akibat bakteria.



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan 1 jam sebelum atau 2 jam selepas makan
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat tablet dalam bekas asal pada suhu bilik ($23^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Sirup erythromycin boleh disimpan dalam peti sejuk. Baki sirup erythromycin perlulah dibuang selepas 7 hari dibuka/diguna.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah alahan pada ubat ini.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: muntah-muntah dan cirit-birit)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - ketidakselesaan dan kekejangan perut
 - loya
 - muntah-muntah
 - cirit-birit

- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - kadar degupan jantung yang tidak sekata & degupan jantung yang cepat
 - Sindrom seperti myasthenia (kelemahan otot)

Rujukan:

- Drugs.com
- rxlist.com
- BNF 70
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
