

LOPINAVIR+RITONOVIR

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Merawat jangkitan Human Immunodeficiency Virus (HIV).



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan jumlah HIV di dalam darah.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (20°C - 25°C) bagi tablet dan pada suhu peti sejuk (2°C - 8°C) bagi ubat cecair. Simpan jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami masalah buah pinggang, masalah hati, masalah pankreas, diabetes, potassium atau magnesium tahap darah rendah, tahap kolesterol tinggi, masalah jantung, masalah saluran darah jantung, atau degupan jantung yang tidak teratur.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:cirit-birit berdarah, denyutan jantung tidak sekata).
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Cirit-birit, sakit dan kembung perut, loya atau muntah.
 - Sakit kepala, pening atau letih.
 - Mulut kering dan ulser mulut.

- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Migrain
 - Debaran jantung tidak sekata
 - Kesukaran untuk bernafas.
 - Sakit sendi dan kelemahan otot
 - Cirit-birit berdarah
 - Kebas atau kesemutan di sekitar bibir, mulut, tangan atau kaki.

Rujukan:

- <https://www.ubat.info/medicine-ms/lopinavir-ritonavir>
- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/lopinavir%20+%20ritonavir?mtype=generic>
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/221/#gref>
- <https://reference.medscape.com/drug/kaletra-lopinavir-ritonavir-342629>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
