

SALAP MUPIROCIN



A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Merawat pelbagai jenis jangkitan kulit.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan pada kulit.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?



A. CARA MAKAN

- Sapu ubat ini pada tempat berkenaan seperti diarahkan oleh doktor
- Ubat ini untuk kegunaan luar sahaja.

B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mempunyai penyakit buah pinggang atau luka terbuka.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: seriawan)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Kulit menjadi kemerah-merahan
- Terasa pedih dan mencucuk
- Kulit menjadi kering atau kegatalan

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Cirit-birit berdarah
- Sakit perut
- Demam

Rujukan:

1. Sisipan maklumat ubat: Mupirocin Ointment 2% (semakan terakhir pada March 2018)
2. <https://www.webmd.com/drugs/2/drug-6180/mupirocin-topical/details>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
