

## IMIPRAMINE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Merawat masalah kemurungan dan juga masalah kanak-kanak kencing malam.

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan memulihkan ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak (bagi masalah kemurungan) dan juga menghalang kesan bahan semulajadi badan pada pundi kencing (bagi masalah kanak-kanak kencing malam dalam keadaan tidur).

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?



#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini perlu dimakan bersama makanan atau selepas makan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama

#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah penyakit darah tinggi dan penyakit jantung.
- ✚ Mengambil sebarang ubat yang berkaitan darah tinggi, penyakit jantung atau masalah emosi.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:keletihan)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPINGAN UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sembelit
- Tekanan darah rendah.
- Loya atau muntah
- Sakit kepala
- Keletihan

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Perubahan mental yang mendadak (*mood swings*).
- Bacaan tekanan darah menjadi rendah dan denyutan nadi rendah secara tiba-tiba dan berpanjangan.
- Kesan mengantuk dan keletihan yang melampau.

Rujukan:

- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/imipramine?mtype=generic> (accessed on 6/10/2021)
- Sisipan maklumat ubat: Imipramine (Tofranil-PM®). Mallinckrodt Inc; 2014
- <https://go.drugbank.com/drugs/DB00458> (accessed on 6/10/2021)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---