

GRANISETRON

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?

- Ubat ini dapat mengubati dan mencegah loya serta muntah.



B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini mengelakkan loya dan muntah dengan cara menghalang reseptor yang boleh menyebabkan loya dan muntah.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan sebelum/ selepas makan.
- Dos pertama ubat ini perlu diambil sejam sebelum bermulanya rawatan kemoterapi/ radiasi.



B. JIKA TERLUPA

- Maklumkan kepada doktor sekiranya anda terlupa mengambil dos sejam sebelum rawatan kemoterapi/ radiasi.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: pening yang teruk).
- Didapati hamil dan memberi susu badan.
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

 Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit.
- Keletihan.
- Sukar tidur.
- Sakit kepala.

 Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Rasa letih yang melampau.
- Degupan jantung yang laju.
- Tekanan darah tinggi.

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/mtm/granisetron.html> (accessed on 20/9/2021)
- <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.594.pdf> (accessed on 20/9/2021)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
