

LEVONOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL (NORDETTE®)

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- + Ubat ini digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- + Ubat ini bertindak dengan mencegah pelepasan telur semasa kitaran haid, menjadikan cecair vagina lebih tebal untuk mencegah sperma mencapai telur untuk bersenyawa, selain itu ia juga mengubah lapisan rahim untuk menghalang pelekatan telur yang telah disenyawakan.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- + Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doctor.
- + Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas .
- + Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- + Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat tetapi abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- + Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ⊕ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ⊕ Jauhkan daripada kanak-kanak.
- ⊕ Pastikan ubat ditutup dengan ketat.
- ⊕ Buang ubat yang telah dibuka seperti diarahkan oleh doktor.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mempunyai penyakit darah beku
- ⊕ Tekanan darah tinggi
- ⊕ Kanser payudara atau rahim
- ⊕ Sejarah penyakit berkaitan jantung
- ⊕ Masalah hati dan buah pinggang
- ⊕ Mempunyai kolestrol tinggi atau kencing manis



➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ⊕ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ⊕ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- mual
- muntah
- sakit kepala
- kekejangan perut / kembung
- kelembutan payudara
- bengkak kaki
- peningkatan berat badan

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- sesak nafas
- pernafasan yang cepat
- sakit dada / rahang / lengan kiri
- Berpeluh yang luar biasa
- kekeliruan
- pening atau pengsan secara tiba-tiba
- sakit / bengkak / kehangatan di pangkal paha
- sakit kepala yang teruk
- gangguan penglihatan secara tiba-tiba

Rujukan:

- Drugs.com
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
