

MEDROXYPROGESTERONE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini diguna untuk merawat pendarahan rahim yang tidak normal.
- ✚ Memulihkan kitaran haid pada wanita yang hampir putus haid.
- ✚ Ia juga diguna untuk mengurang gejala menopaus.



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan menggantikan atau menambah hormon seks wanita yang dihasilkan secara semulajadi yang dipanggil progesteron.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor
- ✚ Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat tetapi abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ⊕ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik ($23^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ⊕ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mempunyai penyakit jantung
- ⊕ Sejarah barah payudara atau rahim
- ⊕ Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan



➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ⊕ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ⊕ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Payudara lembut dan mengeluarkan cecair
- perubahan kitar haid
- kemurungan
- pertumbuhan rambut pada muka atau jerawat
- rambut gugur
- sukar untuk tidur
- insomnia
- sakit kepala, pening

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- sakit, bengkak, kemerahan, atau lemah pada sebelah kaki sahaja
- percakapan menjadi perlahan
- pening dan pitam
- sakit dada
- susah bernafas
- penglihatan jadi kabur atau hilang.
- degupan jantung menjadi kuat atau cepat
- sukar untuk bernafas atau menelan

Rujukan:

- Drugs.com
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
