

## EPERISONE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Mengatasi kekejangan otot



### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan melonggarkan otot. Ini dapat mengurangkan kekejangan otot dan meningkatkan peredaran darah

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh diambil selepas makan.
- ✚ Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai penyakit hati.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: cirit-birit atau pening kepala)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Rasa keletihan
  - Pening kepala
  - Tona otot menurun
  
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Kejutan dan reaksi alahan
  - Penanggalan kulit yang teruk, demam, kulit kemerahan, melepuh, gatal, keradangan mulut dan bibir
  - Mengantuk, kesukaran untuk tidur, kebas, kejang kaki
  - Penurunan berat badan yang mendadak, ketidakselesaan perut, cirit-birit, sembelit dan dahaga
  - Ketidakupayaan untuk mengawal dan mengosongkan pundi kencing

Rujukan:

- Risalah maklumat ubat: Myonal®
- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/eperisone> (accessed on 21/9/2021)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---