

## SALAP MATA CHLORAMPHENICOL

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini digunakan untuk mengubati jangkitan akibat bakteria pada mata.




### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan pada mata.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA GUNA

- 1) Cuci tangan sebelum menggunakan ubat mata.
- 2) Dongakkan kepala dan lihat ke atas.
- 3) Tarik kelopak mata ke bawah dengan lembut untuk membentuk satu saku.
- 4) Picit tiub untuk mengeluarkan kira-kira 1cm jalur nipis salap ke bahagian dalam kelopak mata.
- 5) Biarkan kelopak mata tertutup selama sekurang-kurangnya 30 saat (jangan mengerdip, menggosok, mengelap atau memicit mata).
- 6) Tekan lembut hujung tepi bahagian dalam kelopak bawah mata dengan jari selama satu minit bagi membolehkan ubat diserap oleh mata.



## C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

### B. JIKA TERLUPA

- + Sapu dos yang terlupa sebaik sahaja teringat tetapi abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- + Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- + Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- + Jauhkan daripada kanak-kanak.
- + Pastikan ubat ditutup dengan ketat.
- + Buang ubat yang telah dibuka seperti diarahkan oleh doktor.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: iritasi)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Iritasi (rasa pedih atau gatal) pada bahagian mata.
- Pening atau sakit kepala.
- Pandangan menjadi kabur.
- Mata berair dan rasa tidak selesa.

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- mengalami pendarahan atau mudah lebam
- sakit tekak
- demam
- keletihan luar biasa
- bengkak pada muka/mata/bibir mulut
- susah bernafas
- ruam pada seluruh badan.
- 

Rujukan:

- Drugs.com
- BNF 70
- Sisipan maklumat ubat

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---