

UBAT TITIS MATA - ATROPOINE 1%

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini digunakan oleh doktor sebelum dan selepas pembedahan mata.



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membuka atau membesarkan saiz anak mata

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MENGGUNAKANNYA



- Cuci tangan, dongakkan kepala dan lihat ke atas.
- Tarik kelopak mata ke bawah dengan lembut dan titiskan satu titisan ubat ke dalam mata.
- Biarkan kelopak mata tertutup (~30 saat) dan tekan lembut hujung tepi bahagian dalam kelopak bawah mata dengan jari (~1 minit)
- Tunggu 5-10 minit jika perlu menggunakan lebih daripada satu titisan ubat atau perlu menggunakan ubat titis mata jenis yang lain
- Ubat ini hanya bertahan selama 12 jam sahaja selepas dibuka. Baki yang tidak digunakan perlu dibuang.
- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

B. JIKA TERLUPA

- Ambil dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

D. PERINGATAN !!!

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT



NOTA:

- 1) C.BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT sepatunya berada dalam kota “BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?” di atas)

➤ SEBELUM MENGAMBIL UBATINI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah alahan/alergi kepada ubat ini
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBATINI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

➤ SEMASA MENGGUNAKAN UBATINI

- ✚ Maklumkan kepada doktor jika anda;

✓ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: bengkak muka/lidah/tekak, kepeningan, susah bernafas atau ruam kegatalan kulit yang merebak.)

✓ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

⚠ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Rasa mengantuk
- Sakit kepala
- Kabur penglihatan
- Mata dan mulut kering
- Kepekaan mata terhadap cahaya meningkat

Rujukan:

- Product insert
- Drugs.com
- Webmd.com

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
