

UBAT TITIS MATA CEFTAZIDIME

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Merawat keratitis pada mata.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Mengurangkan bengkak dan kemerahan dalam mata

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?



A. CARA DIAMBIL

- ✚ Ambil ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Untuk kegunaan luaran sahaja
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama

B. JIKA TERLUPA

- ✚ Ambil dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal dalam peti sejuk (2°C - 8°C), jauh dari haba, dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan
- ✚ Sensitif terhadap ceftazidime

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Mata/muka/bibir mulut bengkak, sukar bernafas atau ruam kegatalan kulit yang merebak
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Kesan sampingan semakin teruk dan berterusan

Rujukan:

- drug.com

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
