

## UBAT TITIS MATA CHLORAMPHENICOL

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini digunakan untuk mengubati jangkitan akibat bakteria pada mata.




### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan pada mata.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA GUNA



- Dongakkan kepala ke atas.
- Tarik kelopak mata bawah sedikit untuk membentuk poket.
- Pegang botol ubat titis mata di atas mata secara terbalik
- Pandang ke atas dan titiskan satu titis ubat ke dalam mata.
- Tutup mata dan tekan ke arah dalam mata selama 1 minit untuk mengelakkan ubat terus masuk ke dalam kelenjar air mata.
- Jika dos ubat titis mata lebih daripada satu titis, tunggu 5 minit sebelum dos seterusnya.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### B. JIKA TERLUPA

- ⊕ Titis dos yang terlupa sebaik sahaja teringat tetapi abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ⊕ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- ⊕ Simpan di dalam peti sejuk ( $2^{\circ}\text{C}$  hingga  $8^{\circ}\text{C}$ ), kecuali jika diarahkan oleh pengilang untuk menyimpan ubat di tempat yang kering dalam suhu bilik dan jauh daripada haba atau cahaya matahari secara langsung.
- ⊕ Jauhkan daripada kanak-kanak.
- ⊕ Pastikan ubat ditutup dengan ketat.
- ⊕ Buang ubat yang telah dibuka seperti diarahkan oleh doktor.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan  
(contoh: iritasi)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Iritasi (rasa pedih atau gatal) pada bahagian mata.
- Pening atau sakit kepala.
- Pandangan menjadi kabur.
- Mata berair dan rasa tidak selesa.

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- mengalami pendarahan atau mudah lebam
- sakit tekak
- demam
- keletihan luar biasa
- bengkak pada muka/mata/bibir mulut
- susah bernafas
- ruam pada seluruh badan.

Rujukan:

- Drugs.com
- BNF 70
- Sisipan maklumat ubat

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---