

UBAT TITIS MATA CIPROFLOXACIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini merawat jangkitan bakteria dalam mata dan merawat ulser di dalam kornea mata




B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan pada mata.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA GUNA



- 1) Dongakkan kepala ke atas.
- 2) Tarik kelopak mata bawah sedikit untuk membentuk poket.
- 3) Pegang botol ubat titis mata di atas mata secara terbalik
- 4) Pandang ke atas dan titiskan satu titis ubat ke dalam mata.
- 5) Tutup mata dan tekan ke arah dalam mata selama 1 minit untuk mengelakkan ubat terus masuk ke dalam kelenjar air mata.
- 6) Jika dos ubat titis mata lebih daripada satu titis, tunggu 5 minit sebelum dos seterusnya.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

B. JIKA TERLUPA

- ✚ Titis dos yang terlupa sebaik sahaja teringat tetapi abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.
- ✚ Pastikan ubat ditutup dengan ketat.
- ✚ Jangan gunakan ubat ini selepas 28 hari dibuka.

- ✚ Mempunyai sejarah alahan pada ubat ini.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah alahan pada ubat ini.
- ✚ Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: iritasi)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Iritasi (rasa pedih atau gatal) pada bahagian mata.
 - Pening atau sakit kepala.
 - Mata berair dan rasa tidak selesa.

- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Pandangan kabur.
 - Bengkak pada mata.

Rujukan:

- Drugs.com
- BNF 70
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
