

## SELEGILINE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Merawat simptom penyakit Parkinson

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan meningkatkan kecekapan pengawalan otot dan mengurangkan kekakuan.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini biasanya diambil bersama makanan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengambil sebarang ubat terutama **antidrepsi**, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Jangan ambil makanan yang mempunyai kandungan tiramin yang tinggi

Elakkan minuman yang mengandungi alkohol atau kafein (kopi, teh, kola) dan coklat

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:cirit-birit)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sakit perut, cirit-birit
- Mulut kering
- Loya atau muntah
- Sakit kepala, pening, pitam (terutamanya apabila anda bangun dari posisi duduk atau baring)
- Pergerakan otot yang tidak normal
- Perubahan mood atau fikiran (halusinasi), sukar untuk tidur

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Muka/mata/bibir/lidah/tekak bengkak
- Kesukaran untuk bernafas
- Ruam kulit yang gatal pada seluruh badan
- Ketengangan/sakit di bahagian leher

Rujukan:

- <https://www.webmd.com/drugs/2/drug-13489-8041/selegiline-oral/selegiline-oral/details> (accessed on 07/10/2021)
- <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697046.html> (accessed on 07/10/2021)
- Risalah maklumat ubat: PHARMANIAGA SELEGILINE TABLET
- [https://www.pharmacy.nhg.com.sg/uploadedfiles/apps/pil/9/Malay/Selegiline\\_Malay.pdf](https://www.pharmacy.nhg.com.sg/uploadedfiles/apps/pil/9/Malay/Selegiline_Malay.pdf)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---