

## POTASSIUM IODIDE & IODINE (LARUTAN LUGOL'S)

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini digunakan bersama-sama dengan ubat anti-tiroid lain sebelum pembedahan pembuangan kelenjar tiroid
- ✚ Melindungi kelenjar tiroid daripada terdedah kepada radiasi.
- ✚ Mengeluarkan kahak dan melegakan pernafasan



### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengecutkan kelenjar tiroid dan mengurangkan perembesan hormon tiroid
- ✚ Menghalang kelenjar tiroid daripada menyerap sebarang radiasi iodine.
- ✚ Mencairkan kahak

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat perlu diambil bersama-sama makanan atau susu untuk mengelakkan ketidaksesuaian perut



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai alahan terhadap iodide atau iodine
- ✚ Mempunyai masalah *dermatitis herpetiformis*, *hypocomplementemic vasculitis*, atau nodular tiroid dengan kegagalan jantung.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan  
(contoh: Bengkak kelenjar)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- loya
- muntah
- sakit perut
- cirit birit
- rasa logam di dalam mulut
- demam
- sakit kepala
- jerawat

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Mulut dan tekak rasa terbakar
- Sakit gigi/gusi, bengkak dalam mulut atau air liur keluar dengan banyak
- Pedih mata atau bengkak kelopak mata
- Bengkak pada tengkuk
- Tanda-tanda fungsi kelenjar tiroid terganggu (berat badan meningkat, tidak tahan sejuk, denyutan jantung tidak menentu, sembelit dan rasa letih )
- Rasa keliru

Rujukan:

- Lexicomp
- Drugs.com
- medicinenet.com/

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---