

GABAPENTIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Digunakan bersama ubat lain bagi mengawal dan mencegah sawan.
- Ianya juga digunakan untuk melegakan sakit yang berkaitan saraf.



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan bahan kimia dan saraf yang terlibat dalam menyebabkan sawan dan rasa sakit

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doctor
- ✚ Ubat ini perlu dimakan semasa makan malam
- ✚ Ubat ini hendaklah ditelan terus, tidak boleh dikunyah, dibelah atau dihancurkan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat tetapi abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya
- ✚ Jangan gantikan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.
- ✚ Pastikan ubat ditutup dengan ketat.
- ✚ Buang ubat yang telah dibuka seperti diarahkan oleh doktor.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah penyakit buah pinggang, penyakit hati atau jantung
- ✚ Mengalami gangguan jiwa
- ✚ Mengambil ubat anti depresi
- ✚ Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Pening atau sakit kepala.,
- Muntah atau berasa mual
- Pandangan menjadi kabur.
- Bengkak pada tangan, kaki
- Masalah koordinasi

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Episode sawan meningkat
- Demam, ruam dan bengkak pada nodus limfa
- Susah bernafas atau menelan
- Lemah dan keletihan yang luarbiasa
- Masalah buah pinggang dan bengkak pada pergelangan kaki dan betis

Rujukan:

- Drugs.com
- Sisipan maklumat ubat
-

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
