

ZONISAMIDE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Ubat ini merawat penyakit sawan (epilepsy).

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan rangsangan saraf yang menyebabkan sawan.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit buah pinggang (batu karang), penyakit hati, masalah kemurungan dan masalah jantung.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Hamil, merancang untuk hamil dan menyusu badan.

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: kemurungan).
- ✚ Didapati hamil dan member susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/ alergi kepada ubat ini.



AMARAN !!

E. KESAN SAMPING UBAT

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Pening (terhuyung hayang)
 - Hilang selera makan
 - Sukar untuk tidur
 - Sukar untuk fokus
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Gejala masalah mental (kemurungan, terfikir untuk bunuh diri, psikosis).
 - Sakit di bahagian mata sehingga menyebabkan penglihatan terganggu.
 - Gejala batu karang (sakit bahagian abdomen, darah dalam air kencing).
 - Gejala kerosakan hati (loya/ muntah yang berterusan, hilang selera makan, sakit di bahagian abdomen, perubahan warna air kencing).
 - Gejala alahan yang teruk (demam, ruam, rasa gatal, rasa pedih di kulit dan bengkak di kawasan muka dan kerongkong).

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/mtm/zonisamide.html> (accessed on 25/9/2021)
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/7870/smpc>
- <https://reference.medscape.com/drug/zonegran-zonisamide-343025>
- Zonegran (zonisamide) [package insert]. Tainan City, Taiwan: Eisai Co. Ltd.; 2019.

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
