

TIPROLIDINE HCL + PSEUDOEPHEDRINE (ACTIFED)

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Melegakan gejala gangguan saluran pernafasan seperti hidung tersumbat, selsema dan resdung.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Triprolidine ialah ubat antihistamin yang membantu mengurangkan simptom selsema dengan menghalang tindakan histamin.
- ✚ Pseudoephedrine mengecilkan salur darah di dalam hidung untuk melegakan hidung tersumbat akibat selsema atau resdung.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?



A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil untuk jangka masa yang disyorkan oleh doktor.

B. JIKA TERLUPA

- ✚ Jika terlupa untuk mengambil satu dos, ambil dos seterusnya apabila diperlukan
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit berkaitan masalah saluran pernafasan, penyakit buah pinggang, penyakit hati dan masalah jantung.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: sakit kepala yang teruk)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Rasa lali dan mengantuk
 - Gemuruh, sukar tidur, pening, mulut, hidung atau tekak kering
 - Loya dan muntah
 - Pening

- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Sakit kepala yang teruk secara tiba-tiba
 - Kesukaran untuk membuang air
 - Reaksi alahan: seperti ruam kulit, gatal-gatal dan bengkak
 - Mengalami kesukaran bernafas

Rujukan:

- Pseudoephedrine and tiprolidine, *Drugs.com*. Retrieved on 8/9/2021 from <https://www.drugs.com/pseudoephedrine-and-tiprolidine.html>
- Tiprolidine-Pseudoephedrine Tablet, *Webmd*. Retrieved on 8/9/2021 from <https://www.webmd.com/drugs/2/drug-3158/triprolidine-pseudoephedrine-oral/details>
- Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP) Actifed

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
