

DIPHENOXYLATE HCL + ATROPINE SULFATE (LOMOTIL®)

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini digunakan untuk melegakan cirit-birit.



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini merupakan agen antimotiliti bertindak dengan memperlambangkan pergerakan usus.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat tablet dalam bekas asal pada suhu bilik, jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah alahan pada ubat ini.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Pening, mengantuk, keletihan atau sembelit.

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Sembelit yang teruk
- Loya & muntah
- Sakit/tidak selesa pada abdomen/perut

Rujukan:

- Drugs.com
- Sisipan maklumat ubat
- myhealth.gov.my

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
