

MAGNESIUM TRISILICATE MIXTURE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini digunakan untuk melegakan kesakitana perut akibat asid berlebihan (pedih ulu hati, ketidakhadaman asid, dan perut tidak selesa).



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan meneutralkan asid yang dirembeskan dalam perut.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini perlu dimakan selepas makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBATINI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan
- Mengambil ubat-ubatan/ suplemen tambahan yang lain.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBATINI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: cirit -birit)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

✿ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit
- Kerengsaan mukosa
- Peningkatan tahap magnesium dalam darah

✿ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Batu karang

Rujukan:

- Mims.com
- Sisipan ubat.

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
