

SUCRALFATE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini digunakan untuk mengubati dan menghalang ulser pada usus (Duodeal ulcer).



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak menyelaputi ulser yang dapat menghalang asid daripada terkena ulser. Ini dapat membantu ulser sembuh dengan cepat.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini perlu dimakan sebelum makan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: sakit perut)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Sembelit
 - Cirit-birit
 - Pening
 - Loya dan muntah

- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Reaksi alahan: susah bernafas dan bengkak pada muka, bibir, lidah dan juga tekak.
 - Loya dan muntah selepas makan
 - Susah untuk menelan

Rujukan:

- webmd.com
- Drug.com

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
