

## TOLTERODINE TARTRATE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Merawat simptom sindrom pundi kencing yang terlalu aktif.



### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan kontraksi pundi kencing.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Tidak dapat membuang air kecil, mengalami glaukoma yang tidak terkawal, myasthenia gravis, ulser dan keradangan usus besar atau megacolon toksik (dilatasi akut usus besar).
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: mulut kering)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Kekeringan pada mulut disebabkan kekurangan rembesan air liur (xerostomia)
  - Sakit kepala
  - Kesukaran atau kesakitan semasa membuang air kecil, tidak dapat mengosongkan pundi kencing
  - Penglihatan yang tidak normal, termasuk kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan jarak
  - Cirit-birit
  
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Bengkak pada muka, lidah atau farinks.
  - Kesukaran untuk menelan.
  - Gatal-gatal dan kesukaran untuk bernafas.
  - Sakit dada, sukar bernafas atau mudah letih (walaupun dalam keadaan rehat), sukar bernafas pada waktu malam, bengkak kaki.
  - Reaksi hipersensitiviti (contohnya gatal, ruam, gatal-gatal, sukar bernafas).

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/mtm/tolterodine.html> (accessed on 4/10/2021)
- <https://www.rxlist.com/detrol-drug.htm>
- <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2243.pdf>
- <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1535.pdf>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---