

## CAPECITABINE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Ubat ini bertujuan untuk merawat pesakit kanser kolon, kanser payudara dan kanser esofagastrik.

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengawal sel kanser dari merebak dan mengecilkan saiz sel kanser

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor iaitu 2 kali sehari atau setiap 12 jam.
- ✚ Ubat ini perlu dimakan selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah penyakit buah pinggang.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Crit birit
- Loya
- Muntah
- Sakit bahagian abdomen
- Sembelit
- Hilang selera makan
- Kehilangan air dari badan

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Cirit birit 4 kali atau lebih dari biasa setiap hari.
- Muntah lebih dari sekali dalam tempoh 24 jam.
- Hilang selera makan sehingga mengganggu rutin pemakanan harian.
- Sakit, bengkak atau kemerahan pada tangan atau kaki sehingga mengganggu rutin seharian.

Rujukan:

- Sisipan Maklumat Ubat Xeloda®
- <http://www.rxlist.com/xeloda-drug.htm>
- <http://www.gene.com/patients/medicines/xeloda>
- <http://www.chemocare.com/chemotherapy/drug-info/Xeloda.aspx#.U3x-qgLPfUw>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---