

TAMOXIFEN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini digunakan untuk merawat kanser payudara



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan menghalang reseptor hormone wanita (estrogen) pada sel kanser di payudara lalu menghalang perkembangan sel tersebut.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah penyakit darah beku atau strok dan penyakit hati
- ✚ Mempunyai sejarah penyakit katarak atau menerima rawatan kemoterapi.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami tanda pembekuan darah seperti bengkak pada betis atau paha, sakit dada, sesak nafas atau tiba-tiba lemah badan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

E. KESAN SAMPING UBAT

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Peluh malam serta panas badan
 - Rambut gugur
 - Lelehan dari faraj
 - Berat badan berkurang
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Tanda-tanda strok seperti sakit dada, sukar bernafas dan percakapan tidak jelas
 - Pendarahan vagina yang luarbiasa
 - Kesakitan pada bahagian bawah perut
 - Masalah hati seperti jaundis, air kencing gelap, hilang selera dan sakit bahagian atas perut.
 - Perubahan pada penglihatan dan sukar melihat
 - Ketulan baru timbul pada payudara

Rujukan:

- Micromedex
- Lexicomp
- Drugs.com
- rxlist.com
- BNF 70
- medicinenet.com/
- netdoctor.co.uk
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

