

TRETINOIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



✚ Ubat ini digunakan untuk merawat kanser jenis *Acute Promyelocytic Leukemia (APL)* yang tidak berjaya dengan rawatan kemoterapi yang lain.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

✚ Ubat ini bertindak mengurangkan simptom dan keterukan penyakit APL dengan menggalakkan pertumbuhan dan mematangkan sel darah pada sum-sum tulang seterusnya menambahbaik simptom pendarahan, kelesuan dan mengurangkan risiko jangkitan kuman.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini perlu dimakan bersama-sama makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah alahan/alergi kepada ubat ini
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Pening/sakit kepala
- Kulit dan mulut menjadi kering dan merah-merah
- Berdebar-debar (degupan jantung tak sekata)
- Sukar tidur
- Bengkak kaki dan tangan

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Demam panas
- Sakit perut yang teruk
- Sesak nafas
- Kencing atau najis berdarah

Rujukan:

- Lexicomp
- Drugs.com
- rxlist.com
- BNF 70
- medicinenet.com/
- netdoctor.co.uk
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
