

PYRIDOSTIGMINE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Merawat tanda-tanda penyakit myasthenia gravis

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mencegah aktiviti enzim kolinesterase yang berlebihan dan membantu otot berfungsi dengan sempurna.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit buah pinggang, penyakit hati dan masalah jantung (Degupan jantung yang perlahan atau tidak teratur).
- ✚ Menhidapi asma, sawan, pendarahan dalam perut / ulser perut dan sukar membuang air kecil
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ut
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan mer



➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:cirit-birit)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Penglihatan kabur
 - Gangguan perut, cirit-birit
 - Loya atau muntah
 - Sakit kepala
 - Berpeluh dan muka kemerahan
 - Otot bergerak-gerak atau perembesan air mata dan air liur yang berlebihan.

- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Kadar denyutan jantung yang tidak normal
 - Penganan
 - Ruam kulit
 - Penganan
 - Keguguran rambut
 - Cirit-birit yang teruk
 - Kelemahan otot yang teruk
 - Kesukaran bernafas/menelan/kencing/bercakap atau kekeliruan.

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/mtm/pyridostigmine.html> (accessed on 07/10/2021)
- <https://reference.medscape.com/drug/mestinon-regonol-pyridostigmine-343068> (accessed on 07/10/2021)
- Risalah maklumat ubat: MESTINON®
- https://www.pharmacy.nhg.com.sg/uploadedfiles/apps/pil/32/Malay/Pyridostigmine_Malay.pdf

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
