

RIVASTIGMINE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Merawat tanda-tanda penyakit Alzheimer bertahap ringan atau sederhana.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan mengekalkan enzim asetilkolin pada paras yang tinggi.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini biasanya diambil bersama makanan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- + Mengalami penyakit buah pinggang, penyakit hati dan masalah jantung (Degupan jantung yang perlahan atau tidak teratur).
- + Menhidapi asma, sawan, pendarahan dalam perut / ulser perut dan sukar membuang air kecil
- + Mengambil sebarang ubat (terutama antihipertensi-kumpulan beta-blocker), vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- + Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- + Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:cirit-birit, loya, muntah)
- + Didapati hamil dan memberi susu badan
- + Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.

AMARAN !!

E. KESAN SAMPING UBAT

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sakit perut, cirit-birit
- Hilang selera makan, susut berat badan
- Loya atau muntah
- Sakit kepala, pening, pitam
- Kerap membuang air besar
- Sakit kepala, pening
- Letih atau lemah
- Rasa gelisah

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Muka/mata/bibir/lidah/tekak tenggorokan
- Kesukaran untuk bernafas
- Ruam kulit yang gatal pada seluruh badan
- Ketengangan/sakit di bahagian leher
- Halusinasi

Rujukan:

- <https://reference.medscape.com/drug/exelon-oral-solution-rivastigmine-343069#0> (accessed on 07/10/2021)
- <https://www.drugs.com/mtm/rivastigmine.html> (accessed on 07/10/2021)
- Risalah maklumat ubat : EXELON®
- [https://www.pharmacy.nhg.com.sg/uploadedfiles/apps/pil/68/Malay/Acetylcholinesterase%20Inhibitors%20\(Donepezil_Galantamine_Rivastigmine\)_Malay.pdf](https://www.pharmacy.nhg.com.sg/uploadedfiles/apps/pil/68/Malay/Acetylcholinesterase%20Inhibitors%20(Donepezil_Galantamine_Rivastigmine)_Malay.pdf)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
