

## ETORICOXIB

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Sebagai ubat tahan sakit dan mengurangkan bengkak atau keradangan.

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan menghalang tindakan COX-2, sejenis enzim yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan demam.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama atau bila perlu sahaja.



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit hati, buah pinggang, jantung, atau darah tinggi
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: sakit perut)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Sembab
  - Sakit kepala/pening
  - Berdebar
  - Loya, muntah, cirit-birit, atau sembelit
  
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Kesukaran untuk bernafas
  - Masalah kekuningan (Jaundice)
  - Sakit perut yang berpanjangan atau najis berwarna gelap
  - Mengalami kesan alergik (contoh: bengkak mulut dan lidah)

Rujukan:

- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/etoricoxib?mtype=generic>
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/10618/pil>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---