

FENTANYL PATCH

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- *Fentanyl Patch* digunakan untuk melegakan kesakitan yang teruk yang dijangkakan akan berlarutan dan tidak dapat dirawat dengan ubat tahan sakit yang lain

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ia bertindak dengan mengurangkan isyarat rasa sakit di otak dan sistem saraf.



C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA GUNA

1. Bersihkan kawasan yang hendak ditampal *patch* dan keringkan. Jangan gunakan sabun, losyen, alkohol atau minyak.
2. Buka bungkusan *fentanyl patch*. Keluarkan patch dari bungkusan dan buang lapisan pelindung. Cuba jangan sentuh bahagian yang berpelekat.
3. Tampalkan *patch* dengan segera di bahagian dada atas, belakang atas atau lengan atas. Jangan tampal patch dibahagian kulit yang sensitif, terlalu berminyak atau luka. Kawasan berbulu hendaklah digunting rapat (tidak boleh cukur).
4. Tekan patch dengan tapak tangan selama 30 saat. Pastikan *patch* melekat secara dengan sempurna. Jika *patch* tidak melekat dengan baik, tampil *first aid tape* disekeliling *patch*. Jika masih tidak melekat, tutup patch dengan pelekat jernih seperti Tegaderm®.
5. Jika *patch* tertanggal sebelum cukup 72 jam, tampil *patch* baru. Tukar setelah 72 jam.
6. Selepas selesai menampal *patch*, basuh tangan anda dengan segera.
7. Elakkan pendedahan patch kepada haba seperti selimut panas dan lain-lain.
8. Tukar *patch* setiap 72 jam. Tanggalkan *patch* yang lama dan tampil *patch* yang baru di tempat yang berbeza.
9. *Patch* yang telah ditanggalkan hendaklah dilipat bahagian berpelekat dan dibuang dalam manduk tandas.



C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

B. JIKA TERLUPA

- Tampal sejurus selepas teringat. Jangan menambah dos untuk menggantikan dos yang tertinggal. Tukar selepas 72 jam.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.
- Buang ubat yang telah dibuka seperti diarahkan oleh doktor.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: iritasi)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Mual dan muntah-muntah,
 - Sembelit
 - Rasa mengantuk
 - Pening kepala
- ⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Denyutan jantung menjadi perlahan, pernafasan yang lemah (sehingga selepas beberapa hari menanggalkan patch)
 - Sakit dada atau berdebar-debar
 - Mengantuk yang melampau seperti hendak pitam

Rujukan:

- 1) <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601202.html> (Accessed on 13/5/2019)
- 2) <https://www.rxlist.com/duragesic-drug/patient-images-side-effects.htm> (Accessed on 13/5/2019)
- 3) Sisipan ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
