

NAPROXEN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ia digunakan untuk merawat kesakitan dan keradangan.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ia bertindak dengan mengurangkan hormon dalam badan yang menyebabkan keradangan dan sakit.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Makan ubat ini sebelum atau selepas makan .Ambil Lepas makan jika menyebabkan kerengsaan apabila diambil dengan perut kosong
- ✚ Ubat ini hanya diambil apabila perlu. Jika anda diarahkan mengambil ubat ini secara berjadual, ambil pada waktu yang sama setiap hari tidak melebihi dari tempoh yang ditetapkan



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.
- ✚ Buang ubat yang telah dibuka seperti diarahkan oleh doktor.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: pedih ulu hati)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Ketidakhadaman, pedih ulu hati, loya
 - Sakit kepala, pening dan mengantuk
 - Lebab, gatal dan ruam
 - Bengkak
 - Telinga berdengung
- ⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Sesak nafas
 - Pembengkakan atau peningkatan berat badan
 - Ruam
 - Tanda-tanda pendarahan dalam perut seperti muntah darah atau najis bewarna gelap
 - Masalah hati seperti kencing bewarna gelap, mata atau kulit menjadi kuning
 - Masalah buah pinggang seperti kencing sedikit atau tidak kencing.

Rujukan:

- 1) <https://www.rxlist.com/naprosyn-drug/patient-images-side-effects.htm#info>
(Disemak pada 16/5/2019)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
