

REPAGLINIDE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Digunakan bersama atau sebagai pelengkap kepada diet dan senaman dalam membantu mengawal paras gula dalam darah pesakit kencing manis

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan paras gula dalam darah dengan merangsang pengeluaran insulin dalam badan

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh diambil 30 minit sebelum makan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja anda bersedia untuk mengambil makanan. Abaikan dos sekiranya anda terlepas mengambil makanan, tunggu dan ambil bersama hidangan yang seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!

➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai penyakit penyakit hati.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan



➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:cirit-birit).
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini .



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Paras gula dalam darah menjadi rendah
 - Kembang perut
 - Loya atau muntah
 - Sakit kepala, sakit belakang
 - Simptom selsema seperti hidung tersumbat, sakit tekak dan sebagainya

- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Kulit menjadi pucat atau kekuningan, warna urin menjadi lebih gelap,
 - Sakit dibahagian atas perut menjalar ke belakang badan, loya dan muntah.

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/repaglinide.html> (accessed on 28/8/2021)
- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/repaglinide?mtype=generic>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
